

3. Bygninger og anlegg

3.2. Trevirke. Sopp- og insektangrep: Blåbukk

Dette informasjonsblad er utarbeidet av Mycoteam as, konsulenter i sopp- og insektspørsmål, på oppdrag av Riksantikvaren.

Se også informasjonsblad med generelle opplysninger om sopp- og insektangrep i trevirke..

Utgitt oktober 1991.

Fotografisk opptrykk 2010.

Trykk: DMT kommunikasjon AS



Forstørret blåbukk. Streken angir normal størrelse. Øverst til venstre vises flyvehullet.

Blåbukklarven oppholder seg mellom barken og veden og gnager seg sjelden inn i treverket. Boremelet er farget både av bark og ved.

Blåbukk (*Callidium violaceum*)

Beskrivelse

Blåbukk er en bille som er ca 12 mm lang og som forekommer over hele landet. Larvene lager halvcentimeter store, flate ganger i området mellom barkrester og ved. Boremelet er tofarget på grunn av blandingen av mel fra barken og veden. Larvene gnager sjelden inn i treverket.

Blåbukk er en slektning av husbukken og er antageligvis det insekt som oftest forveksles med husbukk. Den forårsaker bare i liten grad ska-

de på materialer. Larvene lever under barken på bartrær. Eggene legges oftest ute i naturen og følger med trematerialer med barkrester inn i bygninger. Der vil larvene kunne utvikle seg til voksne biller og fly ut.

Behandling

Tiltak mot billen er å fjerne alle barkrester på bygningsmaterialene. Angrepet av blåbukk gir ingen eller ubetydelige svekkelser i materiales bæreevne.



Voksen blåbukk.



RIKSANTIKVARENS INFORMASJON OM KULTURMINNER

Riksantikvaren, Dronningens gt. 13, Postboks 8196 Dep. 0034 Oslo

Tlf. 22 94 04 00. Telefax 22 94 04 04.

e-post: riksantikvaren@ra.no. Internett: www.riksantikvaren.no